



ONDERSTEPSPOORT
BIOLOGICAL PRODUCTS

For animal use only

ORF

FREEZE-DRIED VACCINE

Reg. No. G 1110 (Act 36/1947) Namibia: NSR 0570

A live freeze-dried virus suspension for the prophylactic immunisation of sheep and goats against orf (Contagious pustular dermatitis).

Store the vaccine in a refrigerator at a temperature of 4 °C to 8 °C. Do not use the vaccine after the expiry date printed on the bottle.

RECOMMENDATIONS FOR USE

This product is a suspension of virulent orf viruses, applied to induce planned infection of the animal at a site on the body where no harm will be done. Immunise ewes at least four weeks before lambing. Young lambs, one week or older, may be vaccinated.

WARNINGS

Do not slaughter animals for human consumption within 7 days of vaccination. Vaccinate healthy animals only. Keep out of reach of children, uninformed persons and animals. Caution should be exercised when handling the vaccine as human infection can occur by the virus entering through wounds or scratches in the skin, particularly on the hands and forearms. Do not apply the vaccine in the groin area as this may lead to infection of the udder or the scrotum. Although this product has been extensively tested under a large variety of conditions failure may occur due to various reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

DIRECTIONS FOR USE

Use only as directed.

The active ingredient of the vaccine is in the form of a powder or a pellet in a small bottle. By means of a sterile syringe transfer the 10 ml sterile glycerine water over to the bottle containing the freeze-dried vaccine. Mix until all the powder is dissolved. On the bare skin of the armpit of the animal, using a sterile needle, make 2 - 3 parallel scratches in the skin deep enough to cause redness but not to cause bleeding. The suspension is applied by dipping the small brush provided into the vaccine and dabbing it over the parallel scratches. Avoid exposure to high temperatures and direct sunlight.

EFFECTS OF THE VACCINE

After approximately three days some swelling and redness will be seen at the site of inoculation and a scab will develop. Immunity is of short duration and cannot be guaranteed in all animals. Annual vaccination is recommended.

PACKING

Available in bottles of 100 doses.

Registration holder:

Onderstepoort Biological Products SOC Ltd, Co. Reg. No. 2000/022686/06
Private Bag X07, Onderstepoort, 0110. Tel: +27 (0) 12 522 1500, Fax: +27 (0) 12 522 1591

Made in South Africa

Edition 4

P2113

Vriesgedroogde, lewende vuilbek virus vir die voorbehoedende inenting van skape en bokke teen vuilbek.

Bewaar die entstof in 'n yskas by 'n temperatuur van 4 °C tot 8 °C. Moet nie die entstof na die vervaldatum wat op die bottel gedruk is gebruik nie.

AANBEVELINGS VIR GEBRUIK

Hierdie produk is 'n suspensie van virulente vuilbek virusse wat gebruik word vir beplande besmetting van diere op dele van die liggaam waar die letsel geen skade sal veroorsaak nie. Ent oorie minstens vier weke voor lamtyd. Lamms van een week en ouer kan geënt word.

WAARSKUWINGS

Moet nie die diere binne 7 dae na inenting vir menslike verbruik slag nie. Slegs gesonde diere moet ingeënt word. Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere. Hanteer die entstof versigtig om besmetting van die vel te voorkom aangesien die vuilbek virus wonde en skrape kan infekteer by mense, veral aan die hande en arms. Moet nie die entstof in die lies van die dier aanwend nie aangesien dit infeksie van die uier of die skrotum kan veroorsaak. Alhoewel hierdie produk breedvoerig onder verskeie toestande getoets is, kan die entstof faal onder sekere toestande. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

GBRUIKSAANWYSINGS

Gebruik slegs soos voorgeskryf.

Die aktiewe bestanddeel van die entstof is in die vorm van 'n poeier of klont in 'n klein botteltjie. Dra die 10 ml steriele gliserienwater wat die entstof vergesel met 'n steriele spuit oor na die botteltjie gedroogde entstof. Meng deeglik totdat die poeier opgelos is. Gebruik 'n skoon spuitnaald en maak 2–3 parallelle skrape op die kaal vel net agter die voorbeen, diep genoeg om rooi merke op die vel te maak, maar nie so diep dat dit bloei nie. Neem die kwassie wat voorsien word, doop dit in die entstof, en wend dit op die parallelle skrape aan. Vermy blootstelling van die entstof aan hoë temperature en direkte sonlig.

UITWERKING VAN DIE ENTSTOF

Na ongeveer drie dae sal die vel om die skrapies rooi en opgehewe wees. Later sal 'n roof oor die entplek ontwikkel. Immuniteit is van korte duur en kan ook nie in alle diere gewaarborg word nie. Jaarlikse inenting word aanbeveel.

VERPAKKING

Beskikbaar in bottels van 100 dosisse.

Registrasiehouer:

Onderstepoort Biologiese Produkte MSB Bpk, Mpy. Reg. Nr. 2000/022686/06
Privaatsak X07, Onderstepoort, 0110. Tel: +27 (0) 12 522 1500, Faks: +27 (0) 12 522 1591